

Bibliographie © D. Jutzeler &amp; T. Lafranchis, janvier 2020

ADMIRAL, J. L', 1746 – Naauwkeurige waarnemingen, van veele gestaltverwisselende gekorvene diertjes ; in omtrent 30 jaaren, zo in Vrankryk, Engeland als Holland by een vergaaderd, na het Leeven geschilderd en nu in 't koper gebragt. Changuion, Amsterdam. [Argusje (= megera) : p. 3 ; pl. 5]



Bibliothèque privée anonyme

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369847148?tfy=\[“pages”:\[6\],“view”:“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369847148?tfy=[\)[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369847148?tfy=\[“pages”:\[29\],“view”:“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369847148?tfy=[\)

ALDROVANDI, U., 1602 – De animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus ad viuum expressis. Cum Indice copiosissimo. Bonon : apud Ioan. Bapt. Bellagambam. [(*L. megera*) : Liber Secundus de Insectis, p. 244, fig. 1, 2]

<https://archive.org/stream/deanimalibusinse00aldr#page/238/mode/2up>

BERGSTRÄSSER, J.A.B., 1778-1780 – Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains, mit erleuchteten Kupfern (...). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780). [*Papilio Megaera*, der Bandargus : vol. 3, p. 45-47 ; pl. 72, fig. 1-6]



[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587688661?tfify=\[{"pages": \[49\], "view": "info"}\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587688661?tfify=[{)  
[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587691166?tfify=\[{"pages": \[147\], "view": "scan"}\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587691166?tfify=[{)

BIERMANN, H., & EITSCHBERGER, U., 1996 – Bemerkungen zu *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) und *Lasiommata paramegaera* (HÜBNER, (1824) (Lepidoptera, Satyridae). *Atalanta* 27 (1/2) : 253-319.

[https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta\\_27\\_0253-0319.pdf](https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_27_0253-0319.pdf)

BINK, F.A., & SIEPEL, H., 1996 – Nitrogen and Phosphorus in *Molinia caerulea* (Gramineae) and its impact on the larval development in the butterfly species *Lasiommata megera* (Lepidoptera : Satyridae). *Entomologia Generalis* 20 (4) : 271-280.

BOISDUVAL, J.B.A., 1832 (-1834) – Icônes historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus ; collection avec figures coloriées des Papillons d'Europe nouvellement découverts. 1. Rhopalocères. Roret, Paris. 251 p, 47 pl. [*Satyrus Lyssa* : p. 222 ; pl. 44, fig. 4, 5. «Je ne pense pas que ce satyre puisse constituer une espèce, et je crois devoir le regarder comme une simple modification locale de *Megaera*. Il peut être décrit en deux mots. En dessus il est presque complètement semblable à *Megaera* ; mais le dessous des quatre ailes est pour la teinte, et celui des inférieures pour le dessin, semblable à celui de *Maera*. (...). Ils se trouvent en Dalmatie ; et sur un grand nombre d'individus mâles et femelles, je n'en ai pas trouvé un seul qui ressemblât au *Megaera* ordinaire, quoique ceux de la Morée soient entièrement identiques avec ceux de France».]



Entomologische Sammlung der ETH Zürich

<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/19487900> <https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/19488017>

BOISDUVAL, J.B.A., RAMBUR, D.H., & GRASLIN, A. DE, 1832 (-1837) – Collection iconographique et historique des chenilles, ou description et figures des chenilles d'Europe. 496 p, 126 pl. De Roret, Paris. [*Satyrus megaera* : p. 83-84 ; pl. 2, fig. 5-7. «Cette chenille passe l'hiver sans prendre d'accroissement bien sensible ; mais elle grossit vite à l'approche et au commencement du printemps, et parvient à toute sa taille dans le courant d'avril. (...) Pour se transformer, elle se suspend par la queue. La chrysalide est un peu plus courte que celle du *S. Maera*, à laquelle elle ressemble beaucoup. Elle est de même verte ou noire, légèrement anguleuse, avec deux rangées dorsales de tubercules jaunâtres. Elle se nourrit de graminées. La chenille se rencontre particulièrement au bord des murs et des clôtures en bois. La chrysalide est aussi souvent suspendue le long des murailles».]




5. *Satyrus Megæra* 6. la Chrysalide 7. idem variété

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/109828#page/87/mode/1up>

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/109828#page/525/mode/1up>



<http://www.biodiversitylibrary.org/item/127870#page/185/mode/1up>

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/127870#page/237/mode/1up>

DAPPORTO, L., 2007 – Cuticular lipid diversification in *Lasiommata megera* and *Lasiommata paramegaera*: the influence of species, sex, and population (Lepidoptera: Nymphalidae). *Biological Journal of the Linnean Society* 91 (4) : 703-710.

<https://academic.oup.com/biolinnean/article/91/4/703/2701251>

DAPPORTO, L., 2008 – Geometric morphometrics reveal male genitalia differences in the *Lasiommata megera* / *paramegaera* complex (Lepidoptera, Nymphalidae) and the lack of a predicted hybridization area in the Tuscan Archipelago. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 46 : 224-230.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0469.2007.00453.x>

DE FREINA, J., 1991 – Untersuchungen zu Artreht, Verbreitung und Systematik von *Lasiommata paramegaera* (HÜBNER, 1824) und *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1758). *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft* 81 : 165-173.

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/98698#page/167/mode/1up>

DENIS, M., & SCHIFFERMÜLLER, I., 1775 – Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187, 320-322. [Papilio *Megaera* L., Goldgelb und braun gemischter Falter : p. 166. Chenille inconnue]

3. Unbek. R. — — — — Goldgelb und braunge- mischter F. — — — P. *Megaera*. L.

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tfy=\[“pages”:\[175\],“view”:“info”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tfy=[\)

DENNIS, R.L.H., 1982-1983 – Mate location strategy in the Wall brown butterfly *Lasiommata megera* (L.) (Lepidoptera: Satyridae): wait or seek? *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 94 (1982) : 209-214, 95 (1983) : 7-10.  
<http://www.biodiversitylibrary.org/item/94409#page/229/mode/1up>

DENNIS, R.L.H., 1983 – Egg-laying cues in the Wall Brown butterfly, *Lasiommata megera* (L.) (Lepidoptera: Satyridae). *The Entomologist's Gazette* 34 : 89-95.

DENNIS, R.L.H. 1986 – Selection of roost sites by *Lasiommata megera* (L.) (Lepidoptera: Satyridae) on fencing at Brereton Heath Country Park, Cheshire, U.K. *Nota lepidopterologica* 9 : 39-46.

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/129114#page/47/mode/1up>

DENNIS, R.L.H. 1987 – Hilltopping as a mate location strategy in a Mediterranean population of *Lasiommata megera* (L.) (Lepidoptera, Satyridae). *Nota lepidopterologica* 10 : 65-70.

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/128788#page/71/mode/1up>

DENNIS, R.L.H., & BRAMLEY, M.J., 1985 – The influence of man and climate on dispersion patterns within a population of adult *Lasiommata megera* (L.) (Satyridae) at Brereton Heath, Cheshire (U.K.). *Nota lepidopterologica* 8 (4) : 309-324.

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/128825#page/333/mode/1up>


DUBOIS, Ch.-F., & DUBOIS, A., 1874 – Les Lépidoptères de la Belgique, leurs Chenilles et leurs Chrysalides décrits et figurés d'après nature. Tome premier. Bruxelles, Leipzig, Gand. [*Hipparchia Megaera*, Hipparche Mégère, Schwingelgrasfalter : p./pl. 76. Représentation sur le Paturin annuel (*Poa annua*)]



# Hipparche Mégère, sur le Paturin annuel.

Bibliothèque privée anonyme

DUPONCHEL, P.A.J., 1849 – Iconographie et histoire naturelle des chenilles pour servir de complément à l'histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Bailliére, Paris. Tome 1 (Diurnes) : 244 p, 26 pl. coul. [Satyrus Megæra : p. 180-181 ; pl. 26, fig. 72 a-e. «Cette chenille se nourrit de toute espèce de graminées, et se tient ordinairement au pied des murs et des clôtures en bois. Sa chrysalide est verte ou d'un noir-verdâtre et légèrement anguleuse, avec deux rangées dorsales de tubercules jaunâtres ou blanchâtres.】



72. a - e. Satyre Mégère (*Megæra*)

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/236/mode/1up>

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/239/mode/1up>

ELLIGSEN, H., BEINLICH, B., & PLACHTER, H., 1997 – Effects of large-scale cattle grazing on populations of *Coenonympha glycerion* and *Lasiommata megera* (Lepidoptera: Satyridae). *Journal of Insect Conservation* 1 (1) : 13-23.

<https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1018470723539>

ENGRAMELLE, M.D.J., & ERNST, J.J., 1779-1792 – Papillons d'Europe, peints d'après nature. Première partie. Chenilles, crisalides & papillons de jour. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. Volumes 1-8. Diurnes : tome 1 (1779) et 2 (1780). [Le Satyre (= *megera*) : vol. 1, p. 118-120 ; pl. 26, fig. 50 a-f. «Le Satyre est commun. On le voit presque tout l'Eté dans les bois & les jardins, & il aime à se reposer sur les murs, les pierres & les rochers». – Variété : vol. 2, p. 261-262 ; pl. 65, fig. 50 g, h. «La variété femelle du Satire que nous représentons Fig. 50 g, h est tirée du Cabinet de M. Gigot d'Orcy. Il l'a reçue de M. Hermann qui l'a prise aux environs de Strasbourg». – Chrysalide : vol. 2, p. 322 ; pl. 4<sup>3e Suppl.</sup>, fig. 50 I. «Lorsque nous avons représenté le Satyre, Pl. 26, n° 50, nous ne connaissons ni sa Chenille, ni sa Crisalide. La première nous est toujours inconnue, mais la Crisalide nous a été envoyée par M. de Johet. Nous la donnons sous la Fig. 50 I. Il l'a trouvée le 16 Juillet, attachée à un rocher par son extrémité inférieure, ainsi que se suspendent toutes celles de cette Famille. (...»].]





<http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155030> <http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155179>  
<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155294> <http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155412>  
<https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155355> <https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155458>

ESPER, E.J.C., 1776 - [1830] – Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen, 5 Theile. W. Walters, Erlangen. Die Tagschmetterlinge : Theil 1 (1776-1779), Fortsetzung (1780-1786), Supplement Theil 1, (1789-1803), Supplement Theil 2 (1805, 1830).

[*Papilio Megaera*, Der gelbe bandire Waldvogel, Le Satyre, The golden marbled Butterfly with black eyes, De Argusie : Theil 1, p. 101-105 (1777) ; pl. 6 (1776), fig. 3 a, b (imago, chenille chrysalide). «L'histoire naturelle de la *Megaera* n'est pas trop connue somme toute. Seuls Réaumur et L'Admiral nous ont donné des illustrations de la chenille, mais ils n'en fournirent que des figures non enluminées. Ce fait m'obligea de peindre la chenille d'après leur description. L'Admiral dit que la surface de la chenille est verte et couverte de poils très courts. Le dernier cercle fait saillir deux pointes en direction longitudinale du corps. Elle vit de l'herbe. La figure de la plante-hôte de cet auteur me fait croire qu'il s'agit de *Poa annua*».



fig. 3. a. b. *Megaera*.

Une variété femelle du *P. Megaera*, le mâle de celle-ci et le mâle du *P. Megaera* commun : Fortsetzung, p. 100-102 ; pl. 68 (1781), fig. 1, 2, 4. Esper mit le mâle de son *Pap. Megaera* face-à-face à une variation de Schwalbach en Hesse (fig. 1,2) qui sera considérée plus tard comme *Lasiommata maera* ssp. *adrasta* (Hoffmansegg, 1807)



La chenille du *P. Megaera* et ses chrysalides femelle et mâle : Supplement Theil 1, p. 8-9 ; pl. 94 (1789), fig. 6-8 (chenille, chrysalide verte et noire). «Pour donner une idée provisoire de la chenille du *Pap. Megaera*, je l'avais fournie sur la 6<sup>ème</sup> planche d'après une copie de celle dans l'ouvrage de L'Admiral. Ces derniers temps, elle me tomba le plus souvent entre les mains. Donc, il me sembla inévitable d'en fournir une figure plus précise. Déjà dans les premiers jours de mars lors que le sol était encore gelé, je les trouvai à taille presque pleine. Pour passer les rigueurs de l'hiver, elles avaient choisi un quartier très chaud : les feuilles laineuses de la Molène Bouillon-blanc (*Verbascum Thapsus* Linn.). Je les découvris à la face inférieure d'une feuille à un endroit où plusieurs (feuilles) étaient entassées sur le sol, l'une sur l'autre. Cette plante poussait en abondance près d'un mur où se rassemblaient, toujours au printemps et en automne, aussi de nombreux imagos. Les chenilles découvertes se nourrissent et des feuilles de la Molène et des graminées offertes. (...) Déjà au bout de 8 jours, elles se mirent à se transformer. Dans ce but, elles choisirent un endroit confortable du couvercle du verre pour se fixer à un tissu mince avec leur extrémité abdominale. Elles avaient traversé l'hiver à l'âge de la dernière mue (phase larvaire) (...). À ma grande surprise, j'obtins des chrysalides de couleurs entièrement différentes sans avoir pu constater auparavant n'importe quelle différence entre leurs chenilles. Je gardais séparément les chrysalides des deux couleurs. À la fin de leur développement, il s'avérerait que les chrysalides vertes contenaient les imagos femelles tandis que les noires les mâles même si les deux variations ne différaient du reste ni dans leur taille ni dans leur forme». Selon les expériences d'élevage de DJ, les chenilles de *megera* se développent de façon ralentie mais continue pendant l'hiver. La relation indiquée entre la couleur de la chrysalide et le sexe de l'imago qui en résulte est douteuse.]



*Fig. 6. larva fig. 7. 8. Chrysalides P. Megaerae (Tab. VI. LXVIII).*

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/9/mode/1up>

FABRICIUS, J.C. 1793 – Entomologia systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adjectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus III. Pars I. Proft, Hafniae. [*Papilio Megaera* : p. 94, n° 292]


**Megaera.** 292. *P. N. alis dentatis luteis fusco fasciatis : anticis ocello, posticis supraquinis, subtus sex.*  
Linn. Syst. nat. 2. 771. 142.  
Esp. pap. 1. tab. 6. fig. 3.  
Holl. Inf. tab. 1. fig. 3.  
Schaeff. Icon. tab. 148. fig. 3. 4.  
Wilks pap. 53. tab. 2. 6. 3.  
Harr. Inf. tab. 27. fig. e. f. g.  
Habitat in Europae graminosis.  
Larva villofa, viridis, pallido striata, cauda bifida.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/245389#page/108/mode/1up>

GEOFFROY, E.L., 1762 – Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris ; dans laquelle ces Animaux sont rangées suivant un ordre méthodique. Durand, Paris. 2 volumes. [Le Satyre (= *megera*) : p. 50-51, n° 19]

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991697/f52.image>

GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie – Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul. (1822). [Satyre Mégère, *Papilio Megaera* (Linn.), Le Satyre (Engram.) : 1<sup>re</sup> partie, p. 160-162 ; pl. 7 Sext, fig. 3 (♀ recto)]



### 3 Saty. Mégère , fem.

Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/38004#page/242/mode/1up>

GODART, J.-B., 1819-1824 – Papillon. In : LATREILLE & GODART, Histoire Naturelle. Entomologie, ou Histoire Naturelle des Crustacés, des Arachnides et des Insectes. Encyclopédie Méthodique. Agasse, Paris. Tome Neuvième : 828 p. : p. 1-328 (1819), 329-803 (1824), 804-828 = supplément (1824) [Satyrus Megaera, Satyre Mégère : p. 503-504]

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58338273/f15.image>

HARKER, R., & SHREEVE, T., 2008 – How accurate are single site transect data for monitoring butterfly trends ? Spatial and temporal issues identified in monitoring *Lasiommata megera*. *Journal of Insect Conservation* 12 (2) : 125-133.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-007-9068-7>

HARRIS, M., 1840 – The Aurelian, A natural history of English moths and butterflies, together with the figures of their transformations and of the plants on which they feed. Westwood, London. [*Hipparchia Megaera*, The Wall (or Great Argus) Butterfly : p. 13 ; pl. 27, fig. a-g]



<https://archive.org/stream/Aurelian00Harr#page/n119/mode/2up>

HEMMING, A.F., 1931 – New material regarding the dates of the plates of the Papiliones in Jacob Hübner's "Sammlung europäischer Schmetterlinge", with notes on the synonymy and type localities of certain species described therein. *Transactions of the Royal Entomological Society of London* 79 (3) : 493-504. (p. 502-503) «**Pararge megera lyssa**, Frr. – *Papilio lyssa*, Frr. Geyer, Plate 186, figs. 114, 115 ♂ (r. 914, 915), 116, 117 ♀ (r. 916, 917) [1827-1830] – This subspecies of *Pararge megera*, Linn., is always attributed to Hübner, but as this plate (plate 186) of Geyer's was published in the period 1827-1832 (thus ranking for priority from 1832), the authorship of the name should be credited to Freyer, by whom it was published independently in 1829 (*Beitr. Gesch. Europ. Schmett.*, 2 (12) : 66). Freyer gives no locality. In 1833 Boisduval (*Ic. hist. Lépidopt. Europe*, 1 (17 & 18) : 222) redescribed *lyssa*, which he attributes to Parreyss and which he says was found in Dalmatia. This should therefore be accepted as the type locality».

[Document original : Bibliothek der ETH Zürich](#)

HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der von Büffonschen Naturgeschichte, 11 Bände. Pauli, Berlin. Bände 1+2 (1783-1784) von Carl Gustav Jablonsky ; Bände 3-11 von Johann Friedrich Wilhelm Herbst – Band 3 (1788), 4 (1790), 5 (1792), 6 (1793), 7 (1794), 8 (1796), 9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [*Papilio Megaera* : vol. 8, p. 172-174 ; pl. 207, fig. 3, 4]




Fig. 3, 4. *Megaera mas.*

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN617362009?tfify=\[{"pages": \[184\], "view": "info"}\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN617362009?tfify=[{)  
[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623319004?tfify=\[{"pages": \[53\], "view": "info"}\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623319004?tfify=[{)

HOLLAS, F., 1932 – *Pararge megera* L., *maera* L. und *aegeria* var. *egerides* Stgr. *Entomologischer Anzeiger* 12 : 185-204, 219-222, 240-243 ; 13 : 1-4, 23-26, 54-57, 69-72, 96-98, 109-111.

[https://www.zobodat.at/pdf/EntAnz\\_12\\_0185-0188.pdf](https://www.zobodat.at/pdf/EntAnz_12_0185-0188.pdf)

HÜBNER, J., 1793-1842 – Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg. Suivi par C. GEYER. [*Papilio Megaera* : pl. 31 (1801, planche annulée), fig. 1a, b (chenille, chrysalide)].



Avec l'autorisation de la maison éditoriale Harald Fischer. Tous droits réservés. Source : Jakob Hübner, Geschichte europäischer Schmetterlinge, édition sur CD-rom de 500 planches originales scannées en haute définition illustrant la biologie de 774 espèces différentes. Harald Fischer Verlag, Erlangen, 2004

HÜBNER, J., 1796-1838, dès 1827 (pl. 182, fig. 896) suivi par C. GEYER – Sammlung europäischer Schmetterlinge. Augsburg. 7 volumes (9 parts). Diurnes, part 1. Hübner décrivit les Diurnes jusqu'à la planche 124 (fig. 636). La date imprimée des descriptions est 1805 tandis que l'année de parution est 1806. [*Papilio Megaera*, Schwingelgrasfalter : pl. 39 (1799-1800), fig. 177, 178. Description : p. 29. Patrie : Allemagne. Synonymes : *Pap. Megaera* Linn. – *Papilio Lyssa* : pl. 186 (1827-1828), fig. 914-917. Selon Boisduval (voir ci-dessus), le taxon *lyssa* représente une forme locale dalmate de *L. megera*.]



Bibliothèque privée anonyme


<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89180#page/37/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/81/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/375/mode/1up>

HÜRTER, H.-A., 1998 – Die wissenschaftlichen Schmetterlingsnamen, Herleitung und Deutung. Pomp, Bottrop. ISBN 3-89355-176-X. [*Lasiomma megera* : p. 158-159. «L'orthographe "megera" résulte certainement des suites d'une erreur de transcription ; "megaera" serait correct». Pour d'autres détails à ce sujet voir sous Linnaeus, 1767.]

JONSTON, J., 1653 – Historiae naturalis de insectis. Libri. III. de serpentibus et draconibus, libri II cum æneis figuris. Merian, Francofurti ad Moenum. [(*L. megera*) : pl. 6, 7, 8]



[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN499698371?tify=\[“pages”:\[65\],“view”：“info”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN499698371?tify=[\)

JUTZELER, D., & BROS, E. de, 1997 – Quelques aspects peu connus des stades préimaginaux de *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1767) d’Italie centrale (Lepidoptera : Nymphalidae, Satyrinae). *Linneana Belgica* 16 (1) : 43-47.

KARLSSON, B., & WIKLUND, C., 1984 – Egg weight variation and lack of correlation between egg weight and offspring fitness in the wall brown butterfly *Lasiommata megera*. *Oikos* 43 (3) : 376-385.

[https://www.jstor.org/stable/3544156?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3544156?seq=1#page_scan_tab_contents)

LAFRANCHIS, T., JUTZELER, D., GUILLOSON, J.-Y., KAN, P. & B., 2015 – La Vie des Papillons. Ecologie, Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [*P. megera* : p. 568-569]



<http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html>

LEMPKE, B.J., 1947 – Notes sur quelques formes de *Pararge megaera* L. *Lambillionea* 47 (1-2) : 17-24.

LEWIN, W., 1795 – The Insects of Great Britain, systematically arranged, accurately engraved, and painted from nature with the natural history of each species. The figures engraved from the subjects themselves, by the author. Vol. 1. Johnson, London. [Megaera, Orange Argus, L’Argus orangé : p. 46-47 ; pl. 21, fig. 1-5]



[https://archive.org/stream/b28778169#page/80\(mode/2up](https://archive.org/stream/b28778169#page/80(mode/2up)

LINNAEUS, C., 1767 – Systema Naturae per Regna Tria Naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio duodecima, Reformata. Laurentii Salvii, Holmiae. Tomus 1, Pars II: p. 533-1327, Lepidoptera p. 744-796. [*Papilio Megera* : p. 771, n° 142. Selon Hürter (1998), l’orthographe *megera* remonterait à une erreur de transcription car *megaera* serait correct. Le nom latin *Megaéra* (en grec : Μέγαιρα) désigne une des trois Furies (Alecto, Tisiphone, Megaera) ou les déesses de la vengeance respectivement (en grec : Érinyes ou Euménides). En se basant sur leurs représentants les plus éminents : Denis & Schiffermüller, Esper, Fabricius, Hübner, Boisduval et Duponchel, l’orthographe avec “æ” prédomine dans toute la

littérature ancienne. D'après les articles 23 et 32 des règles du CINZ, l'orthographe avec "e" conforme à la première description de Linné de 1767 est cependant déterminante. Staudinger l'appliqua pour la première fois dans son catalogue de 1901 (voir ci-dessous). L'orthographe avec "ae" est par contre correcte d'après les règles du CINZ au contexte du nom composé "paramegaera" désignant le Satyre Tyrrhénien ainsi décrit par Hübner en 1824.]

**Megera. 142. P. N. alis subdentatis luteis fusco fasciatis: utrinque primoribus fesquiocello; posticis supra quinis.**  
**Habitat in Austria, Jacquin; in Dania, Fabricius.**

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN362053723?tfy=\[“pages”:\[241\],“view”:“info”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN362053723?tfy=[\)

LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d'après nature. Pauquet, Paris. [Satyre Mégère (= megera) : p. 73, pl. 31. «Très commun aux environs de Paris, dans les mois de mai et de juillet».]



*S. Mejæra* SATYRE MEGERE. SAT. MEJÆRA. GOD.  
*Papilio Mejæra. LINN. — Le Satyre. ENG.*

Bibliothèque privée anonyme

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/85/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/291/mode/1up>

MEIGEN, J.W., 1829-1832 – Systematische Beschreibung der Europäischen Schmetterlinge ; mit Abbildungen auf Steintafeln. 3 volumes: 1 (1829), 2 (1830), 3 (1832). Mayer, Aachen et Leipzig. [*Maniola Megaera* : vol. 1, p. 133-134 ; pl. 34, fig. 4 a-c]



Bibliothèque privée anonyme

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=143>

MERIAN, M. S. 1683 – Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Anderer Theil. 100 p., 50 pl. Frankfurt am Main. [(*L. megera*) : pl. 4 (image 22)]



[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN476005221?tfy={"view":"info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN476005221?tfy={)

MERIAN, M. S., 1730 – De europische Insecten, Naauwkeurig onderzogt, na't leven geschildert, en in print gebragt door Maria Sibilla Merian : Met een korte Beschryving, waar in door haar gehandelt word van der Rupsen begin, Voedzel en wonderbare Verandering (...) 84 p., 184 pl. coul. Bernard, Amsterdam. [(*L. megera*) : pl. 54 (= image 62, en haut à gauche)]




[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN475975456?tfy={"pages":62,"view":"info"}](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN475975456?tfy={)

MEVI-SCHÜTZ, J., & ERHARDT, A., 2003 – Effects of nectar amino acids on fecundity of the wall brown butterfly (*Lasiommata megera* L.). *Basic and Applied Ecology* 4 (5) : 413-421.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179104701358>

MOUFFET, T. 1634 – Insectorum sive minimorum animalium theatrum: Olim ab Edoardo Wottono. Conrado Gesnero. Thomaque Pennio. Et ad vivum expressis iconibus supra quingentis illustratum. [(*L. megera*) : p. 104, fig. 10]



<https://archive.org/stream/insectorumsivemi00moff#page/104/mode/2up>

OBERTHÜR, Ch., 1896 – De la variation des lépidoptères. Rhopalocera : p. 1-42 (Papilionidae p. 1, Pieridae p. 3, Lycaenidae p. 8, Nymphalidae p. 29, Satyridae p. 31, Hesperiidae p. 38). *Études d'Entomologie*, vol. 20. [Parage Megaera, Linn., ♂ ab. *melania*, de la collection Bellier : p. 33, pl. 2, fig. 12]



Bibliothèque privée anonyme

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/39622#page/11/mode/1up>

OBERTHÜR, Ch., 1909 – Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères. *Etudes de Lépidoptérologie comparée* 3 : 101-404. [Parage Megaera Linné, p. 364-367 ; pl. 124 (fasc. 6) (fig. 1104 : Parage Megaera-Pallescens, Obthr., ♀ Saxe ; 1105, 1106 : P. Megaera-Mediolugens Fuchs, ♂ et ♀, patrie inconnue, ex coll. Bellier ; 1107 : P. Megaera-Lugens Obthr., ♀ Reichenbach en Silésie)]



Bibliothèque privée anonyme

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/520/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/41287#page/337/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/41287#page/421/mode/1up>

OBERTHÜR, Ch., 1914 – Faune des Lépidoptères de Barbarie. *Pararge Megaera*, Linn. : Études de Lépidoptérologie comparée : 10.1, p. 351-352]

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/37366#page/361/mode/1up>

OCHSENHEIMER, F., 1807-1835 – Die Schmetterlinge von Europa. Gerhard Fleischer, Leipzig. 10 Bände. 1. Theil, 1. Abtheilung (1807) : Falter oder Tagschmetterlinge, 323 p. [*Papilio Megaera* : p. 235-238]


<http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/247/mode/1up>

OLIVER, C.G., 1972 – Genetic differentiation between English and French populations of the Satyrid butterfly *Lasiommata megera*. *Heredity* 29 : 307-313.

PERREIN, C., 2012 – Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en Loire-Atlantique et en Vendée. Presses universitaires de Rennes. ISBN 978-2-7535-1968-8. Présentation illustrée. [*Lasiommata megera*, Satyre (mâle), Mégère (femelle) : p. 292-291]



PETIVER, J., 1717 – Papilionum Britanniae Icones, nomina etc., London. In : EMPSON, J., 1767, Jacobi Petivera Opera, Historiam Naturalem spectantia : containing several thousand figures of Birds, Beasts, Fish, Reptiles, Insects, Shells, Corals, and Fossils (...) On above Three Hundred Copper-Plates, with English and Latin Names. Volume 2. London. [*Papilio Oculatus*, ex aureo & fusco marmoreatus, The London Eye (= *megera*) : p. 2 ; pl. 5, fig. 7, 8]



7. *Papilio Oculatus*, ex aureo & fusco marmoreatus,  
Mus. no. 312. Ray 123.15. The London Eye. These I  
have met with from May till August, but not very com-

mon.

8. Idem areâ fuscâ. London Eye, with a brown List.  
Found with the last, and may be Male and Female.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/182859#page/260/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/182859#page/269/mode/1up>

RAY, J., 1710 – Historia insectorum. Opus posthumum Jussu Regiae Societatis Londinensis Editum. Cui subjungitur appendix de scarabaeis Britannicis, autore M. Lister S.R.S. ex MSS. Musæi Ashmolæani. Churchill, Londini. [Papilio media, alis fulvo seu rufo & nigricante colore variis (= megera) : p. 123, n° 15]

15. *Papilio media*, alis fulvo seu rufo & nigricante colore variis, cum ocello  
prope extimum angulum alarum exteriorum. *Papilio oculatus* ex aureo &  
fuscâ marmoreatus, Mus. Pet. 312. The golden marbled Butterfly  
with black Eyes.

<http://digilib.hab.de/drucke/nh-276/start.htm>

Roos, P., 1978 – Die Präimaginalstadien der Satyriden. 3. *Lasiommata megera* Linné (Lep., Satyridae). *Dortmunder Beiträge zur Landeskunde, Naturwissenschaftliche Mitteilungen* 12 : 115-122.

Roos, P., 1979 - Die Präimaginalstadien der Satyriden 4. Vergleichende Merkmalsanalyse der Präimaginalstadien von *Lasiommata petropolitana* Fabricius und *Lasiommata megera* Linné unter Berücksichtigung serologischer Untersuchungen (Lepidoptera, Satyridae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 28 : 110-118.

[http://www.landesmuseum.at/pdf\\_frei\\_remote/NachBIBayEnt\\_028\\_0110-0118.pdf](http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/NachBIBayEnt_028_0110-0118.pdf)

SCHAFFER, J.C., 1766 (-1779) – Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae – Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insecten. Zunkel, Regensburg. Vol. 1.1 (pl. 1-50), 1.2 (pl. 51-100), 2.1 (pl. 101-150), 2.2 (pl. 151-200), 3 (pl. 201-280). Classification d'après Panzer, 1804. [Papilio Megaera, Der Bandargus, Der gelbbordirte Waldvogel, Le Satyre : p. 141 ; vol. 2.1, pl. 148, fig. 3, 4]



Bibliothèque privée anonyme

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN609338285?tfy=\[“pages”:\[171\],“view”：“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN609338285?tfy=["pages":[171],"view":"scan"])

[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN386936277?tfy=\[“pages”:\[104\],“view”：“scan”\]](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN386936277?tfy=["pages":[104],"view":"scan"])

SEIZMAIR, M., 2015 – Einige Erstmeldungen zur Rhopaloceren-Fauna der Insel Ustica – Nachtrag mit der Beschreibung von *Lasiommata megera usticae* subspec. nov. (Lepidoptera, Rhopalocera). *Atalanta* 46 : 97-99.

SEPP, J.C., 1762-1860 – Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen : of Nederlandsche insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderlyke gedaantewisseling en andere wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't koper gebracht en gekleurd. Amsterdam. Deel 1 (1862), deel 2 (1786), deel 3, 4 (date inconnue), deel 5 (1836), deel 6 (1843), deel 7 (date inconnue), deel 8 (1855-1860). [De Argus – Vlinder (= megera) : Deel 2 (1786), Stuk 1, p. 5-12 ; pl. 2 et 3, fig. 1-10]





Bibliothèque privée anonyme

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/104118#page/34/mode/1up>

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/104118#page/36/mode/1up>

STAUDINGER, O., & WOCKE, M., 1871 – Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne. I. Macrolepidoptera. Rhopalocera : p. 1-35 [Pararge Megaera Linnaeus, Systema Naturae, editio XII (= megera) : p. 30, n° 371].

- |  |  |
|--|--|
| 371. <b>Megaera</b> L. S. N. XII, 771; Esp. 6, 3., 68, 4; Hb. 177-8; O. I., 1. 235. ? God. I, 7 sext. 3; <b>Xiphia</b> B. Ic. 44, 6.<br><b>Megaerina</b> HS. VI p. 19 ab. intermedia.<br>a. v. <i>Lyssa</i> B. Ic. 44, 4. 5, I p. 222; H.-G. 914-7 (al. post. subt. cinerascentibus).<br>b. v. <i>Tigelius</i> Bon. Deser. T. I, 2 (1824); B. Ic. 45, 1-3; Dup. I, 30, 5-7; Frr. B. 68, 1 (v. minor, dilutior).<br><i>Paramegaera</i> Hb. 842-4 (post 1824 ?); Butl. Cat. 124. | <i>Eur. (exc. reg. pol); Maur; As. min; Arm.</i><br><i>Dalm; Balc. m; As. min.</i><br><i>Cors; Sard.</i> |
|--|--|

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/38252#page/74/mode/1up>

STAUDINGER, O., & REBEL, H., 1901 – Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes. Friedländer & Sohn, Berlin. [Pararge Megera (recte Megaera) L.S.N. ed. XII : p. 60, n° 390. Dans son catalogue de 1901, Staudinger changea l'orthographe "Megaera" à "Megera" (détails voir sous Linné).]

- |  |  |
|--|--|
| 390. <b>Megera</b> (r. <i>Megaera</i> ) L. S. N. ed. XII, 771; <i>Megaera</i> Esp. 6, 3; 68, 4; Hb. 177-8; O. I. 1. 235; ? God. I, 7 sext. 3; Z. Isis 1847, 140; Barr. Brit. Lep. I t. 32; Tutt. Brit. Butt 392; <i>Xiphia</i> B. Ic. 44, 6; <i>Megaerina</i> HS. VI, p. 19 ab. intermedia; ab. <i>Mediolugens</i> Fuchs Jhrb. Nassau 1892 p. 87; ab. <i>Alberti</i> Albert Ent. Zeit. Guben IX, p. 57 [al. ant. ocell. 2 magnis]. | <i>Eur. (exc. reg. pol); Maur; As. min; Arm.</i> |
|--|--|

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/210640#page/121/mode/1up>

VERITY, R., 1922-1923 – On the Geographical and Seasonal Variations of *Pararge megera* L. *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 34 (1922) : 209-214, 35 (1923) : 23-29.

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/36513#page/283/mode/1up>

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/95108#page/37/mode/1up>

VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles, Paris, 472 p. Parution : vol. 1 : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 : 201-311 (1952), 313-364 (1952) ; vol. 3 : 365-472 (1957). [*Pararge megera* : p. 437-442]

WICKMAN, P.O., 1988 – Dynamics of mate-searching behaviour in a hilltopping butterfly, *Lasiommata megera* (L.) : the effects of weather and male density, *Zoological Journal of the Linnean Society* 93 : 357-377.

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1096-3642.1988.tb01367.x/abstract>

WILKES, B., 1749 – The English moths and butterflies: together with the plants, flowers and fruits whereon they feed, and are usually found. (...) Together with an attempt towards a natural history of the said moths and butterflies. B. Wilkes, London. [(*L. megera*) : image 331 (chenille, chrysalide, imagos)]



[https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN385055587?tify=%22pages%22:\[331\],%22view%22:%22info%22](https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN385055587?tify=%22pages%22:[331],%22view%22:%22info%22)

Photos de *Lasiommata megera* – 1, 2 : la Mégère et le Satyre en zone jurassique au nord de la ville de Schaffhouse (Büttenhardt, 10.09.2008 et 9.09.2010, Hans Peter Matter) – Photos prises par Markus Haab : 3 : Hemmental SH, 9.08.2012 ; 4 : Dättlikon ZH, 15.07.2009 ; 5 : Kappel a. A., ZH, 11.09.2007 ; 6 : Dättlikon ZH, 12.10.2006. – Photos de D. Jutzeler : 6 : chenille au premier stade. Atzmännig SG (CH), 16.06.2014 ; 7 : les chenilles prêtées à se nymphoser de *L. megera* du Mt Faito (Campanie, Italie, 1995) aimait se suspendre aux surfaces perpendiculaires et lisses du pot en plastique planté d'une touffe de Fétueque ovine dont elles se nourrissaient auparavant. D'ailleurs, de nombreux individus se concentraient dans le secteur le plus ombragé de la paroi de ce pot.



